

# POTASSIUM-U tartósítószermentes

tartósítószermentes oldatos szemcsepp

## 1. Mi a POTASSIUM-U tartósítószermentes és milyen esetben alkalmazható

A POTASSIUM-U tartósítószermentes egy izotóniás szemöblítő oldat, amely adalékanyagként kálium-jodidot tartalmaz. Kifejezetten a szembe való cseppentésre szolgál. Az adalékanyagként hozzáadott kálium-jodid oxigénszabadgyök-megkötőként működik a szemben. A kálium-jodid ezen tulajdonságait használják a váladékozás (felgyülemlett szövetnedv) és a szembevérzés megelőzésére, illetve támogató kezelésére.

Szemész szakorvossal való konzultáció nélkül használható egyszerű szemöblítésre, így szembe való cseppentésre vagy szemhéjborogatásra. A termék a szem öblítésére szolgál támogató szerként bizonyos felszívódási folyamatok elősegítésére (különösen váladékozás, üvegtesti vérzés és különböző eredetű szürkehályog esetén).

A POTASSIUM-U tartósítószermentes szemcseppet felnőttek, serdülők és gyermekek is alkalmazhatják.

A POTASSIUM-U tartósítószermentes nem tartalmaz tartósítószerket, ezért ideális termék érzékeny szemű emberek számára.

## 2. Mit szükséges tudnia a POTASSIUM-U tartósítószermentes alkalmazása előtt

Ne alkalmazza a POTASSIUM-U tartósítószermentes szemcseppet, ha allergiás a készítmény bármely összetevőjére (lásd a 6. pontot).

A POTASSIUM-U tartósítószermentes szemcsepp az alábbi esetekben sem használható:

- terhesség és szoptatás
- krónikus pyoderma (gennyes bőrgyulladás) az arcbőrön
- vérzékenység
- pajzsmirigyműködési zavarral rendelkező betegek
- újszülöttek

Ha más szemészeti készítményeket is használ, általában ajánlott legalább 5 percet várni a különböző készítmények alkalmazása között.

## 3. Hogyan kell alkalmazni a POTASSIUM-U tartósítószermentes szemcseppet

A termék pontos adagolását és alkalmazásának időtartamát orvos határozza meg. Általában napi 2-4 alkalommal 1-2 cseppet kell alkalmazni a szembe, a kötőhártyásákba.

### Figyelmeztetés


Közvetlenül a termék alkalmazása után átmenetileg homályos látást tapasztalhat. Ilyen esetben ne vezessen, ne használjon gépeket, vagy várjon, amíg ismét tisztán lát.

### Kontaktlencse-viselőknél

Ha kontaktlencsét visel, azokat el kell távolítania a POTASSIUM-U tartósítószermentes alkalmazása előtt. A POTASSIUM-U tartósítószermentes használata után 20 percet kell várnia, mielőtt visszahelyezi a kontaktlencséit.

### Használati útmutató

1. Mossa meg a kezét, és üljön vagy álljon kényelmesen.
2. Csavarja le a szemcseppentő tartály kupakját.




3. Tartsa a tartályt lefelé fordítva a hüvelykujja és a többi ujj között.
4. Az első alkalmazás előtt ajánlott egy cseppet a szembe kívülről cseppenteni a tartály enyhe megnyomásával, mert annak erős és szabálytalan megnyomása esetén nagyobb mennyiségű oldat távozhat.
5. Ujjával finoman húzza le az érintett szem alsó szemhéját.




6. Helyezze a cseppentő hegyét közel a szeméhez, de úgy, hogy ne érintse a szemet vagy a környező területeket.

7. Óatosan nyomja meg a tartályt, hogy csak 1 csepp kerüljön a szemébe. Ezután engedje el az alsó szemhéját, és lassan csukja be a szemét, hogy a POTASSIUM-U tartósítószermentes egyenletesen eloszlatásra kerüljön a szem felületén.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartály megnyomása és a csepp távozása között néhány másodperc eltelhet. A tartályt nem szabad túl erősen megnyomni.



8. Szükség esetén ismétlje meg a műveletet a másik szemén.



9. Használat után a tartályt egyszer lefelé fordítva meg kell rázni anélkül, hogy a cseppentő hegyét megérintené, hogy eltávolítsa a rajta maradt felesleges folyadékot. Erre a szemcsepp sterilítésének biztosítása, illetve a következő alkalmazás során a következő csepp könnyebb kiadásának elősegítése érdekében van szükség.

10. Az alkalmazás után azonnal szorosan csavarja vissza a szemcseppentő kupakját.

#### 4. Milyen mellékhatások fordulhatnak elő

A POTASSIUM-U tartósítószermentes általában jól tolerálható. Közvetlenül az alkalmazás után átmeneti, enyhe égő érzés léphet fel.

Kontrollálatlan, hosszú távú alkalmazás (túladagolás esetén) érzékeny betegeknél „jodizmust” okozhat. Ez megnyilvánulhat a kötőhártya irritációjában és vérbőségében, megnövekedett könnytermelésben, esetleg a szemhéjak duzzanatában (Quinque-féle ödéma) és a könnymirigy ödémájában; a bőrön bőrpír, akne, bőrgyulladás és bevérzés léphet fel.

Ha bármelyik fentebb leírt mellékhatás vagy más szokatlan reakció lép fel Önnél, tájékoztassa kezelőorvosát.

#### 5. Mit tartalmaz a POTASSIUM-U tartósítószermentes

2 mg/ml nátrium-klorid, kálium-jodid, nátrium-tioszulfát, dinátrium-edetát, nátrium-hidroxid, tisztított víz.

#### 6. Hogyan kell a POTASSIUM-U tartósítószermentes szemcseppet tárolni és egyéb információk

A tartály az eredeti csomagolásában, 25 °C alatt tárolandó. Ne hűtse/fagyassza le.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Ne használja a készítményt a lejárati idő után, amely a tartály címkéjén vagy a dobozon a homokóra ikon mellett található. A lejárati idő a hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ne használja a POTASSIUM-U tartósítószermentes szemcseppet a felbontást követő 12 hétnél tovább. A POTASSIUM-U tartósítószermentes alkalmazása után azonnal szorosan zárja le a tartály kupakját.

**Kiszerezés:** 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o.,  
Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Szlovák Köztársaság  
Tel: +421 2 4333 3786  
Fax: +421 2 4363 8743  
e-mail: [unimedpharma@unimedpharma.sk](mailto:unimedpharma@unimedpharma.sk)  
[www.unimedpharma.eu](http://www.unimedpharma.eu)



2265



**Ez az útmutató 2021. márciusban került frissítésre.**