
UPUTA ZA UPORABU

Uputa za uporabu, pročitajte pažljivo!

SENSIVIT[®] **kapi za oko, otopina**

Sastav

1 ml otopine sadrži 3 mg karmeloza natrija.

Pomoćne tvari: polisorbitat 80, hidroksiopropilbetadeks, alfa tokoferol acetat (vitamin E), natrijev klorid, makrogol glicerol hidroksistearat, vitamin A, natrijev tetraborat, natrijev edetat, benzalkonijev klorid, voda za injekcije.

Djelovanje

SENSIVIT[®] je preparat s umirujućim i vlažećim učinkom. SENSIVIT[®] stabilizira sva tri suzna sloja (suzni film) na površini oka. SENSIVIT[®] sadrži natrijevu sol karmeloze, koja zahvaljujući svojim svojstvima, stvara na površini rožnice i konjunktivalnoj površini, privremeni zaštitni film te također osigurava potreban vlažeći učinak. Na ovaj način SENSIVIT[®] stabilizira vodeni sloj suza. Sadrži vitamin A koji potpomaže stvaranje unutarnjeg, mukusnog dijela suznog filma. Zajedno s vitaminom E poboljšava ishranu rožnice i konjunktive. Tvari koje su sadržane u preparatu također potpomažu stvaranje vanjskog, lipidnog dijela suznog filma. Na taj način one učestvuju u smanjenju isušivanja površine oka čime je tanki sloj suza na površini oka ili ojačan ili raspoređen u sva tri sloja. Na taj način je zaštitni učinak suza značajno sačuvan.

Korištenje

SENSIVIT[®] se koristi za tretman nedovoljnog stvaranja suza i za sve oblike sindroma suhog oka, prema preporuci liječnika. SENSIVIT[®] se može koristiti kod stanja koja zahtijevaju stvaranje i održavanje zaštitnog vlažećeg filma na rožnici i konjunktivi.

Kontraindikacije

SENSIVIT[®] se ne smije koristiti u slučaju preosjetljivosti oka na djelatnu tvar, ili na bilo koju pomoćnu tvar. Pripravak se ne smije davati tijekom trudnoće i dojenja. SENSIVIT[®] nije prikladan za djecu mlađu od dvije godine.

Nuspojave

Rijetko, neposredno nakon primjene, može doći do privremenog blagog peckanja. Također može doći i do reakcije preosjetljivosti. U slučaju pojave ovih nuspojava ili drugih neuobičajenih reakcija obavijestite svog oftalmologa.

Interakcije

U slučaju istovremenog korištenja drugih kapi za oko, SENSIVIT[®] treba primijeniti posljednji u nizu najranije 5 minuta nakon primjene prethodnih kapi za oko. Obavijestite svojeg oftalmologa ako koristite ili ste nedavno koristili neke druge lijekove, ili ih planirate uzimati u budućnosti, uključujući i lijekove koji se uzimaju bez liječničkog recepta. Ako koristite bilo koji preparat za oko, savjetujte se sa svojim oftalmologom o prikladnosti istovremene uporabe.

Doziranje

Ako oftalmolog nije propisao drugačije, 1 kap 1-3 puta na dan ukapa se u konjunktivalnu vrećicu. Oftalmolog će za djecu individualno odrediti dozu.

Preparat mogu koristiti odrasli, adolescenti i djeca starija od dvije godine.

Upozorenje

Neposredno nakon primjene ovog preparata može doći do prolaznog zamućenja vida, pa se 20 minuta nakon primjene ne preporuča upravljanje vozilom, rukovanje strojevima ili rad na visini.

Tijekom primjene preparata ne treba nositi meke kontaktne leće. Prije ukapavanja kapi u oko treba izvaditi tvrde kontaktne leće i vratiti ih najranije 20 minuta nakon primjene preparata.

U slučaju propisanog doziranja, predoziranje je praktički isključeno.

Ako dijete slučajno upotrijebi preparat, obratite se liječniku.

Način primjene

Preparat je namijenjen za uporabu u oko.

Treba odvrnuti zaštitni čep. Bolesnik treba blago nagnuti glavu unazad, okrenuti bočicu prema dolje i blagim pritiskanjem plastične bočice ukapati propisani broj kapi u konjunktivalnu vrećicu. Vrh kapaljke ne smije dodirivati ni oko ni očne kapke. Nakon primjene treba čvrsto zavrnuti zaštitni poklopac, kako bi se izbjegla kontaminacija. Bočica se čuva u uspravnom položaju.

Rok valjanosti

SENSIVIT[®] se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Nakon prvog otvaranja sadržaj bočice se ne smije koristiti dulje od 28 dana.

Pakovanje

1 x 10 ml

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne čuvati u hladnjaku/ne zamrzavati.
Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Nositelj rješenja

UNIMED d.o.o.
Trg Hrvatske Bratske Zajednice 3/a, 21000 Split
Republika Hrvatska

Proizvođač

UNIMED PHARMA spol s.r.o.
Oriešková 11, 82105 Bratislava
Slovačka Republika

Datum izrade upute

Siječanj 2011.

CE₁₂₉₉