

OCUflash®

Natrii chloridum (naatriumkloriid) 7 mg/ml

Silmatilgad, lahus

1. Mis on OCUflash® ja milleks seda kasutatakse

OCUflash® on spetsiaalne silmalahus (isotooniline puhverlahus), mis sisaldab abiainena Euphrasia officinalis´t. Silmatilgad on ette nähtud silma tilgutamiseks või silmade loputamiseks. Euphrasia officinali ekstrakt ehk silmarohu ekstrakt toimib silmas põletikuvastase ja kootava vahendina. Nimetatud omaduste tõttu kasutatakse seda juba pikka aega silmade rahustamiseks, mittenakkusliku lau- ja sidekestapõletiku profülaktikaks ja täiendavaks raviks.

2. Mida peab teadma enne OCUflash®-i kasutamist

OCUflash®-i ei tohi kasutada, kui on suurenenud tundlikkus selle mingi koostisaine suhtes.

OCUflash®-i võivad kasutada täiskasvanud, lapsed. Tänu preparaadi ohutusele võib seda kasutada vastsündinutel ja imikutel, samuti võivad OCUflash®-i tarvitada rasedad ja rinnaga toitvad emad.

Kui patsient tarvitab ka mingeid muid silmatilku või silmasalvi, võib neid kasutada kõige varem 5 minutit pärast OCUflash®-i manustamist.

3. Kuidas OCUflash®-i kasutada

OCUflash® on ideaalne silmade loputamiseks mõeldud lahus eemaldamiseks silmast võõrkehi. Seda võib ilma silmaarstiga konsulteerimata lühiajaliselt kasutada tavaliseks silmade loputamiseks, silma tilgutamiseks või silmalaugudele kompresside tegemiseks. Toode kasutatakse juhul, kui silmas on ebamugav tunne, näiteks kipitus, pakitsus, sügelus või tunne, et silmas on võõrkeha. Praktikas sobib OCUflash® ideaalselt kasutamiseks järgmistel juhtudel:

1. silmade loputamiseks pärast tonomeetriat või gonioskopiat,
2. silma loputamisel sellest võõrkeha, tolmu ja kloorivee eemaldamiseks,
3. fluorestseiinilahuse jääkide eemaldamiseks,
4. limase või mädase sekreeidi eemaldamiseks,
5. silmade pesemiseks pärast kõvade kontaktläätsede kandmist,
6. ideaalse esmaabivahendina pärast kergest sidekesta ja silma erosiooni happelise või leeliselise toime tagajärjel (lubivärv, mört),
7. abivahendina mõnede, enamasti mittenakkuslike, sidekestapõletike ja krooniliste sidekesta infektsioonide korral,
8. sobiva vahendina meigi eemaldamiseks silmapiirkonnast (laugudelt ja ripsmetelt).

Ärritunud silmade rahustamiseks ja täiendavaks raviks mittenakkusliku sidekesta- ja laupõletiku korral tilgutage haigestunud silma (silmade) konjunktivaalkotti 1–2 tilka 1–4 korda päevas. Võõrkeha välja loputamiseks tilgutage lahust, kuni võõrkeha on eemaldatud, seejärel kuni ärrituse leevendumiseni.

Pärast avamist on OCUflash® silmasiseseks kasutamiseks valmis. Patsient eemaldab turvakorgi, kallutab pead kergelt tahapoole, keerab tilguti ava allapoole ja, õrnalt pudelit pigistades, tilgutab alumisse konjunktivaalkotti vajaliku koguse tilku. Lahuse kogus sõltub kasutusviisist. Tilgutage lahust silma või loputage haigestunud silma vastavalt vajadusele (lahuse kogust kontrollitakse pudelikese pigistamisega). Laupõletiku korral võib lahust kasutada ka kompresside tegemiseks. Manustamisel ei tohi tilguti vastu silma, lagusid ega ripsmeid puutada. Pärast toote kasutamist tuleb saastumise vältimiseks kord tugevasti pudelile tagasi keerata. Pudelit peab säilitama vertikaalses asendis.

Hoiatus

OCUflash® ei mõjuta keskendumisvõimet sõiduki juhtimisel, mehhanismide käsitlemisel või kõrgustes töötamisel, kus on vaja suuremat

valvsust. Siiski võib vahel pärast preparaadi tilgutamist konjunktivaalkotti nägemine muutuda ajutiselt ähmaseks, seepärast on suuremat valvsust nõudvad tegevused lubatud alles siis, kui nimetatud toime on lõppenud. Kui juhtub, et laps neelab kogemata lahust alla, kontakteeruge arstiga.

Preparaadi kasutamisel ei tohi patsient kanda pehmeid (eriti hüdrofiilseid) kontaktläätsi. Võimaluse korral ei tohiks ravi ajal kanda ka kõvasid kontaktläätsi või need peaks eemaldama vahetult enne OCUflash®-i kasutamist ja panema tagasi, kui preparaadi tilgutamisest on möödunud vähemalt 20 minutit.

4. Koostoime

OCUflash® on häsi talutav. Harva võib vahetult pärast kasutamist tekkida ajutiselt kerge põletustunne. Samuti võib esineda ülitundlikkusreaktsioon.

5. Mida OCUflash® sisaldab

Natrii chloridum (naatriumkloriid) 7 mg 1 ml-s

Abiained: benzalkonii chloridum (bensalkooniumkloriid) 0,04 mg 1 ml-s (0,004%), dinatrii edetas dihydricus (dinaatriumedetaatdihüdraat), kaalii chloridum (kaaliumkloriid), magnesii chloridum hexahydricum (magneesiumkloriidheksahüdraat), polysorbatum 80 (polüsorbaat 80), tinctura euphrasiae (Euphrasia officinalis tinktuur/ silmarohutinktuur), borax (booraks), natrii hydroxidum (naatriumhüdrosiid), aqua ad injectabilia (süstevesi).

6. Kuidas OCUflash®-i säilitada ja muu informatsioon

Säilitage toodet temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis / mitte külmutada.

Pärast avamist kasutada toodet 28 päeva jooksul.

Hoida lastele kättesaamatult ja nägemispiirkonnast eemal.

Ärge kasutage toodet pärast kehtivusaja lõppemist, mis on märgitud ümbrise sildil või kartongpakendil liivakella kujutise kõrval. Aegumiskuupäev viitab viimasele päevale antud kuul.

Pakendi suurus: 1 x 10 ml, 2 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol s.r.o., Bratislava, Slovaki Vabariik

Tel: +421 2 4333 3786

Faks: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Teksti viimase läbivaatamise kuupäev: juuli 2016.